



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Код: СОП 1-001
Версия: 01
Страница: 27 от
37

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
ЗА
ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ
ПО ЖИВОТНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧАСТ I: СТРАТЕГИЯ И РЕСУРСЕН ПЛАН

Дезинфектант	Форма и концентрация	Време за експлоатация	Подходящ за:
1. Сапун и детергенти		10 мин.	Използван се предимно за почистване и деконтаминация
2. Окислителни			
2 а. Натриев хипохлорид	Течност, разрежда се до получаване на 2-3 % наличен хлор	Да се остави да действа 10-30 мин. Препоръчва се да се използва за оборудване и сгради. Не е подходящ за органични материали	Шап, КЧС, АЧС, ВБС, Везикулозен стоматит, Чума по говедата, Чума по ДПЖ, Шарка по овцете и козите, Инфлуенца по птиците и нюкясълска болест, Болести по рибите
2 б. Калциев хипохлорид	Твърд или прах; разтвор до 2-3 % наличен хлор (20 г/л прах, 30 г/л твърд)	Да се остави да действа 10-30 мин.	Шап, КЧС, АЧС, ВБС, Везикулозен стоматит, Чума по говедата, Чума по ДПЖ, Шарка по овцете и козите, Инфлуенца по птиците и нюкясълска болест, болести по рибите
2 в. Virkon	2 % (20 g/l)	Да се остави да действа 10 мин.	Шап, КЧС, АЧС, ВБС, Везикулозен стоматит, Чума по говедата, Чума по ДПЖ, Шарка по овцете и козите, Инфлуенца по птиците и нюкясълска болест
2 г. Viocid	1 : 400 разреждане	Да се остави да действа 10 мин.	Шап, КЧС, АЧС, ВБС, Везикулозен стоматит, Чума по говедата, Чума по ДПЖ, Шарка по овцете и козите, Инфлуенца по птиците и нюкясълска болест
3. Основи:			
3 а. Натриева основа (сода каустик NaOH)	2 % (20 g/l)	Да се остави да действа 10 мин. Препоръчителен за използване при органични материали. Да не се използва при повърхности с алуминий и подобни сплави	Шап, КЧС, АЧС, ВБС, Везикулозен стоматит, Чума по говедата, Чума по ДПЖ, Шарка по овцете и козите, Инфлуенца по птиците и нюкясълска болест
3 б. Натриев бикарбонат (Na ₂ CO ₃)	4 % (40 г/л-прах).	Да се остави да действа 10 мин. Препоръчителен е за използване при органични материали.	Използван се предимно за почистване и деконтаминация
4. Киселини			
4 а. Солна киселина	2 % (20 мл/л)	Корозивен, да се използва само ако няма други налични.	
4 б. Лимонена	0.2 % (20 г/л)	Да се остави да действа	Шап, Инфлуенца по птиците и